


**PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS
EM ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM**

Rockefellerbr
@LFRockefeller



Vi isso no Facebook e mandei pro meu irmão, que é um farmacêutico



A

Abcesso: coleção de pus em cavidade anormal.

Afagia: impossibilidade de deglutir.

Afasia: perda da palavra falada, escrita ou mímica, por alterações nos centros nervosos.

Afonia: perda ou diminuição da voz por causas locais.

Afecção: estado mórbido, enfermidade.

Algesia: sensibilidade à dor.

Algia: dor de origem subjetiva, sem lesão anatômica ou orgânica apreciável.

Álgico: relativo a dor, doloroso.

Analgesia: perda da sensibilidade para a dor, conservando a sensibilidade tátil.

Anasarca: edema generalizado.

Anisocoria: desigualdade de diâmetro das pupilas.

Anóxia: estado que resulta da insuficiência de oxigênio para satisfazer as necessidades normais dos tecidos.

Antissepsia: conjunto de meios destinados a afastar ou destruir os germes patogênicos e impedir infecção.

Anúria: supressão total da secreção urinária.

Apatia: falta de sentimento ou interesse, indiferença, insensibilidade.

Apirexia: falta de febre, cessação da febre.

Apneia: detenção temporária da respiração.

Arritmia: irregularidade do ritmo cardíaco (número, intervalo e força das batidas).

Atrofia: diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão que havia alcançado seu tamanho normal.

B

Bacteremia: presença de bactérias patogênicas no sangue.

Bradycardia: pulsação lenta do coração (abaixo de 60bpm).

Bradipneia: respiração lenta.

Bradisfigmia: lentidão anormal do pulso.

Broncoespasmo: espasmo dos músculos bronquiais.

C

Caquexia: estado mórbido caracterizado por magreza extrema, perda de peso, sintomas de debilidade e anemia.

Cefaleia: dor de cabeça intensa e douradora.

Cianose: coloração azul ou violácea da pele ou mucosa, devido a um excesso de hemoglobina nos capilares.

Clister: enema, injeção de líquido no intestino, pelo ânus.

Coma: estado de estupor profundo com perda total ou quase total da consciência, da sensibilidade e da motilidade voluntária.

Consciência: estado geral que nos torna aptos a julgar, refletir e decidir.

D

Desorientação: estado de confusão mental em que o indivíduo perde as noções de lugar e tempo.

Diplegia: paralisia de partes similares nos dois lados do corpo. Paralisia bilateral.

Diplopia: visão dupla dos objetos devido aos transtornos da coordenação dos músculos motores oculares.

Disartria: dificuldade na articulação da palavra.

Dispepsia: dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a sede.

Disfagia: deglutição difícil, geralmente dolorosa.

Dispneia: respiração difícil, penosa ou irregular.

Disúria: micção difícil ou dolorosa.

Diurese: eliminação de urina.

Dorsal: referente a dorso, costas.

E

Edema: acumulação excessiva de líquidos nos espaços dos tecidos.

Êmese: vômito.

Entérico: relativo ao intestino.

Enurese: incontinência urinária.

Epigastralgia: dor na região epigástrica.

Epistaxe: fluxo de sangue pelas narinas, hemorragia nasal.

Eupneia: respiração normal, fácil.

F

Ferida: solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas, que espontaneamente evolui para cicatrização.

Filiforme: fino, em forma de fio.

Flatulência: distensão do abdome provocada por gases intestinais.

Frontal: relativo a frente (testa).

G

Gastralgia: dor no estômago

Glicemia: quota fisiológica de glicose no sangue.

Glicosúria: eliminação de açúcar na urina.

Glútea: relativo a nádegas.

Glossa: palavra grega que significa língua.

H

Halitose: fetidez anormal do hálito.

Hemácia: glóbulo vermelho do sangue.

Hematêmese: vômito de sangue procedente das vias digestivas.

Hematúria: presença de sangue na urina.

Hemiplegia: paralisia de um lado do corpo.

Hemoptise: expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório.

Hipertermia: temperatura extraordinariamente elevada.

Hipotermia: descida anormal da temperatura corporal.

Hiperglicemia: aumento anormal no nível de glicose do sangue.

Hipoglicemia: diminuição do nível normal de glicose do sangue.

I

Inter: prefixo que indica "entre", "no meio" (ex: intercostal-entre duas costelas).

Isocoria: igualdade no tamanho das pupilas.

Isquemia: deficiência local e temporária de sangue.

L

Laceração: dilaceração.

Lipotímia: perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a circulação; desmaio.

Lombar: relativo a lombo, ou região que fica ao lado da espinha, sobre os rins, entre o tórax

e a bacia.

M

Mácula: mancha; região da pele corada, plana.

Melena: evacuação sanguínea, dejeção negra que recorda a consistência e a cor de borra de café.

Mioplegia: paralisia muscular.

Mialgia: dor muscular.

Midríase: dilatação da pupila.

Miose: diminuição no diâmetro da pupila.

Menoplegia: paralisia de um membro.

Mucopurulento: que contém muco e pus.

N

Neuralgia: dor viva e paroxística a seguir o trajeto de um nervo.

Nictúria: emissão de urina mais abundante ou frequente à noite que durante o dia. Enurese noturna.

Nistagmo: trêmulo espasmódico das pálpebras; oscilações do globo ocular em torno de um de seus eixos.

O

Odinofagia: deglutição dolorosa.

Oligúria: secreção deficiente de urina.

Onicofagia: hábito mórbido de roer as unhas.

Ortopneia: dispneia intensa que obriga o paciente a estar sentado ou em pé, ou seja, com o tórax em posição perpendicular ao solo.

Otorragia: hemorragia do ouvido.

P

Paraplegia: paralisia de ambas extremidades inferiores do corpo.

Paresia: paralisia incompleta ou parcial, debilidade de contração muscular; desfalecimento.

Parenteral: que se realiza por via distinta da digestiva ou intestinal.

Pelve: bacia (anel ósseo em forma de bacia).

Períneo: espaço compreendido entre o ânus e os órgãos genitais externos.

Pirexia: acesso febril.

Pirose: sensação de queimadura, de ardor que, partindo do estômago, se estende ao longo do esôfago e chega a faringe.

Piúria: presença de pus na urina.

Polaciúria: micção frequente.

Precordial: situado ou que ocorre diante do coração; epigástrico e superfície anterior da parte inferior do tórax.

Precordialgia: dor na região precordial.

Prurido: coceira, comichão.

Ptialismo: salivação exagerada.

R

Regurgitação: retorno dos alimentos do estômago ou do esôfago á boca, sem esforço de vômito.

Ressecamento: obstipação, prisão de ventre habitual.

S

Seborreia: secreção exagerada das glândulas sebáceas, especialmente do couro cabeludo.

Sialorreia: fluxo exagerado da saliva; salivação.

Síncope: desfalecimento, perda súbita dos sentidos.

T

Taquicardia: aceleração das pulsações cardíacas, acima de 85bpm, no adulto.

Taquipneia: respiração acelerada, que se apresenta em condições fisiológicas ou patológicas.

Torpor: estado de sonolência, de apatia.

U

Úlcera: solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas de órgãos, com perda de substância.

V

Vasoconstrictor: diz-se do agente ou nervo que estreita o calibre dos vasos.

Vasodilatador: diz-se do agente ou nervo que aumenta o calibre dos vasos.

Vertigem: perda ou perturbação do equilíbrio, com sensação de instabilidade do corpo e dos objetos circundantes.

Vesical: referente à bexiga.

Volemia: nome com que também se conhece a massa total do sangue.

X

Xifoide: apêndice osteocartilaginoso que remata o esterno na parte inferior.

Bibliografia: Os termos foram retirados do:

"PEQUENO DICIONÁRIO DE TERMOS MÉDICOS".



99

25 April 2018 · 🌐



pareço legal, mas fico corrigindo seus erros de português mentalmente.